PRESTOP®

Mode d'emploi

■ Généralités
PRESTOP® est un fongicide microbien à base d'un champignon du sol, *Gliocladium catenulatum*.
Ce champignon agit par concurrence et par parasitisme de l'organisme cible. L'efficacité du PRESTOP® est prouvée sous diverses conditions climatiques. Il est actif sur une large plage de températures (5 à 30 ° C), à un pH compris entre 3–8.

■ Matière active
Gliocladium catenulatum J1446
(2 x 10^8 cfu / g)……32 %
Contenu inactif …… 68 %

■ Domaine d'application
Remarques préliminaires
Pour lutter contre les champignons pathogènes transmis par le sol, PRESTOP® est appliqué dans le sol ou en mélange avec le substrat. Le produit doit être utilisé dès que possible dans le cycle de la culture, au plus proche des racines.
Pour lutter contre les maladies de la tige ou du feuillage, le produit doit être appliqué sur les zones de la plante à protéger.
PRESTOP® doit être utilisé à titre préventif.

Cultures maraîchères (concombres, tomates, poivrons, plantes aromatiques)
Effet partielle : Fusarium / Pythium / Rhizoctonia, Phytophthora
500 g/m3 en mélange avec le substrat
5 à 10 g/m2 pour le traitement des semis
200 à 250 g/ 1000 plantes (plantes en pot, cultures sur substrat).
L'application doit être répétée 2 à 5 fois à intervalle de 4-6 semaines selon la pression en maladie et la période de culture.

Application par arrosage
L'application sur de petites zones peut être effectuée à l'aide d'un arrosoir ou d'une pompe à traiter. Pour les plus grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser un Dosatron ou un appareil doseur de type AquaNemix 2%.
Les applications ultérieures pourront être effectuées via le système d'irrigation.

Cultures maraîchères (concombres)
Didymella bryoniae (Chancre gommeux sur tige)
1% ou 100g / 1000 plantes (0,5 % dans 500-800 l de l'eau).
L'application doit être répétée sur toute la plante ; 2 à 5 fois à intervalle de 3-4 semaines selon la pression en maladie et la période de culture

Application par traitement
Traitement de la plante entière.

■ Délai d'attente
Aucun délai d'attente.

■ Préparation de la bouillie
1. Remplir la cuve avec de l'eau à moitié du volume désiré et activer l'agitation.
2. Saupoudrer petite à petite la quantité de PRESTOP® directement dans la cuve.
3. Laisser hydrater 30 minutes en maintenant l'agitation.
4. Compléter avec de l'eau
5. Nettoyer le filtre-pompe avant de commencer la pulvérisation.

Remarque : Seul certains gros amas de mycélium sont arrêtés par le filtre. La filtration n'altère donc pas l'efficacité du produit.

■ Miscibilité
Appliquer séparément, PRESTOP® est compatible avec la plupart des fongicides, engrais liquides et insecticides/ acaricides. Vous obtiendrez des détails plus précis sur les possibilités de combinaison auprès de votre conseiller ou sur www.biocontrol.ch → Produit PRESTOP® → Informations supplémentaires.

■ Stockage
Peut être conservé non ouvert pendant 6 mois entre 0 et 5 °C. (date de production: voir sachet dernier 6 chiffres).À température ambiante seulement 4 semaines. Utiliser, si possible, la totalité de l'emballage après ouverture. Une fois ouvert, le paquet se conserve moins bien et doit être bien scellé (hermétiquement fermé).

■ Transport
Pas de restrictions.

■ Elimination
Utilisation des surplus : appliquer les éventuels restes de bouillie et d'eau de rinçage des appareils sur la surface traitée préalablement. Les soldes de produit peuvent être versés sur le compost, sur le tas de fumier ou encore être éliminés avec les ordures ménagères. Rincer les emballages vides et les éliminer avec les ordures ménagères**.**

■ Premiers secours
Après inhalation:
Eloigner la personne concernée de la zone à risque et la conduire à l'air libre. En cas de signe d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antibiotique connu. Si nécessaire, traiter de façon symptomatique.
Après un contact avec la peau:
Nettoyer les parties concernées avec de l'eau et du savon. En cas de signe d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antidote connu. Si nécessaire, traiter de façon symptomatique. Retirer les vêtements humectés.
Après un contact avec les yeux:
Eloigner la personne concernée de la zone à risque. Rincer de suite avec beaucoup d'eau jusqu'à la diminution de l'irritation (min. 10 minutes). Si l'irritation persiste ou qu'il reste des signes d'intoxication, demander un conseil médical. Pas d'antidote connu.
Après ingestion:
Eloigner la personne concernée de la zone à risque. Faire vomir en donnant de l'eau, uniquement si la personne est consciente. Ne rien administrer si la personne est inconsciente. Consulter un médecin.

■ Responsabilité
La firme Andermatt Biocontrol SA décline toute responsabilité en cas de dégâts aux cultures dus à un non respect du mode d'emploi.